

Evaluatie patient op therapie op Denosumab na 3 jaar

Def versie juni '22 RCOP

Klinische risicofactoren, Lab, DXA+VFA voor beslissing stoppen/continueren/switchen van therapie

T-scores >-2.5 , **geen** botverlies $>5\%$ tov baseline + geen nieuwe fracturen of risicofactoren

Ja

Stop schema bij <3 jaar gebruik

Behandel 6 maanden na laatste injectie direct met Zoledroninezuur of Alendroninezuur*

Follow up na 12 maanden na start consolidatietherapie met DXA+VFA

Ja

Stop schema bij ≥ 3 jaar gebruik

Behandel 6 maanden na laatste injectie direct met Zoledroninezuur tenzij redenen voor Alendroninezuur*

Na 6 maanden Lab + kliniek

Herhaal altijd direct Zoledroninezuur, zet Alendroninezuur door

Follow up na 12 maanden na start consolidatietherapie met DXA+VFA

Neen

of

of

Continueer
bij nog niet
behaald
behandeldoel

Na maximaal
10 jaar

Levenslang
*zie tekst voor
uitleg*

Switch naar
Bisfosfonaat

Voor evaluatie
therapie zie
schema <3 jaar

Voor beslissing herstart/continuering/switch therapie

Herstart therapie indien:
T-score ≤ -2.5
Of botverlies $>5\%$ tov baseline
Of nieuwe fractuur
Of nieuwe risicofactoren



Therapie



Therapie 2^e lijn

*3^e en 4^e keuze Risedronaat, Raloxifeen