

Evaluatie patient op therapie op Denosumab na 3 jaar

Def versie juni '22 RCOF

Klinische risicofactoren, Lab, DXA+VFA voor beslissing stoppen/continueren/switchen van therapie

T-scores >-2.5 , **geen** botverlies $>5\%$ tov baseline + geen nieuwe fractures of risicofactoren

Ja

Stop schema bij <3 jaar gebruik

Behandel 6 maanden na laatste injectie direct met Zoledroninezuur of Alendroninezuur*

Follow up na 12 maanden na start consolidatietherapie met DXA+VFA

Ja

Stop schema bij ≥ 3 jaar gebruik

Behandel 6 maanden na laatste injectie direct met Zoledroninezuur tenzij redenen voor Alendroninezuur*

Na 6 maanden Lab + kliniek

Herhaal altijd direct Zoledroninezuur, zet Alendroninezuur door

Follow up na 12 maanden na start consolidatietherapie met DXA+VFA

Neen

of

of

Continueer bij nog niet behaald behan deldoel

Na maximaal 10 jaar

Levenslang
zie tekst voor uitleg

Switch naar Bisfosfon aat

Voor evaluatie therapie zie schema <3 jaar

Voor beslissing herstart/continuering/switch therapie

Herstart therapie indien:

T-score ≤ -2.5

Of botverlies $>5\%$ tov baseline

Of nieuwe fractuur

Of nieuwe risicofactoren

Therapie

Therapie 2^e lijn

*3^e en 4^e keuze Risedronaat, Raloxifeen